

## PROYECTO DE ROTULO/PROSPECTO

**CAFIASPIRINA PLUS: ASPIRINA 650 mg y CAFEINA 65 mg**

Analgésico - Antiinflamatorio -Antifebril

Comprimidos

Venta libre

Industria Argentina

Envase con 80 comprimidos

### COMPOSICION

Cada comprimido contiene:

Aspirina: 650 mg

Cafeína: 65 mg

Almidón de maíz y celulosa en polvo csp: 850,0 mg

### ACCION TERAPEUTICA

Analgésico –Antiinflamatorio- Antifebril

### USO DEL MEDICAMENTO: *Lea detenidamente esta información*

CAFIASPIRINA PLUS está indicada para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, de espalda, musculares y articulares. Alivio sintomático de los estados gripales y resfríos que se acompañan de mal estado general y/o fiebre, y para reducir la fiebre.

### COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Adultos: 1 comprimido cada 6 hs, si es necesario, hasta un máximo de 4 comprimidos en 24 hs.

No tome más de la dosis máxima indicada.

Tome los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 15 años sin consultar al médico.

Consulte al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días; si se observa empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas consulte al médico inmediatamente

No use este medicamento en caso de hipersensibilidad conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos, a la cafeína; en presencia de trastornos hemorrágicos; de úlceras gástricas o duodenales, insuficiencia renal y/o hepática.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consulte con el médico.

Si padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea; consulte con su médico.

No administre este medicamento a menores de 15 años en caso de síntomas de GRIPE o VARICELA ya que puede incrementar el riesgo a desarrollar SÍNDROME DE REYÉ.

Las personas de edad avanzada no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

## PROYECTO DE ROTULO/PROSPECTO

Si usted consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consulte con su médico.

No asociar con comidas, bebidas o medicamentos que contengan cafeína.

Dosis mayores a 60 mg de cafeína aumentan el estado de alerta.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte con su médico antes de ingerir este medicamento.

### REACCIONES ADVERSAS

Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

La cafeína puede producir mareos, irritabilidad, nerviosismo, taquicardia (aumento de la frecuencia cardiaca).

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, antianginosos, corticoides.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

### SOBREDOSIS

En caso de sobredosis concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555

Consultas? Sugerencias? Llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 hs.

Este medicamento como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico

Almacenar a temperatura ambiente inferior a 25°C.

☒ Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de Bayer AG, Alemania, en calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, Buenos Aires

*Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.*

*Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 9.388*

*Fecha de última revisión: 21-Dic-07*

*Disposición N°: 7659/07*