

PROYECTO DE ROTULO/PROSPECTO

CAFIASPIRINA: ASPIRINA 500 mg y CAFEINA 40 mg

Analgésico - Antiinflamatorio -Antifebril

Comprimidos

Venta libre

Industria Argentina

Envase con 100 comprimidos

COMPOSICION

Cada comprimido contiene:

Aspirina: 500 mg

Cafeína: 40 mg

Almidón de maíz csp: 650 mg

ACCION TERAPEUTICA

Analgésico - Antiinflamatorio -Antifebril

USO DEL MEDICAMENTO: *Lea detenidamente esta información*

CAFIASPIRINA está indicada para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de cabeza, dentales, de espalda, musculares y articulares. Alivio sintomático de los estados gripales y resfríos que se acompañan de mal estado general y/o fiebre, y para reducir la fiebre.

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Adultos: 1 comprimido cada 6 hs, si es necesario, hasta un máximo de 6 comprimidos en 24 hs.

No tome más de la dosis máxima indicada.

Tome los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 15 años sin consultar al médico.

Consulte al médico si el dolor persiste más de 5 días, o si la fiebre persiste por más de 3 días; si se observa empeoramiento de los síntomas o aparición de nuevos síntomas consulte al médico inmediatamente.

No use este medicamento en caso de hipersensibilidad conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos, a la cafeína; en presencia de trastornos hemorrágicos; de úlceras gástricas o duodenales, insuficiencia renal y/o hepática.

En caso que aparezcan molestias gastrointestinales, erupciones cutáneas, dificultades respiratorias, vértigo, consulte con el médico.

Si padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota, hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea; consulte con su médico.

No administre este medicamento a menores de 15 años en caso de síntomas de GRIPE o VARICELA ya que puede incrementar el riesgo a desarrollar SÍNDROME DE REYÉ.

Las personas de edad avanzada no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensas a padecer efectos adversos.

PROYECTO DE ROTULO/PROSPECTO

Si usted consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consulte con su médico.

No asociar con comidas, bebidas o medicamentos que contengan cafeína.

Dosis mayores a 60 mg de cafeína aumentan el estado de alerta.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte con su médico antes de ingerir este medicamento.

REACCIONES ADVERSAS

Hipersensibilidad (urticaria, picazón), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

La cafeína puede producir mareos, irritabilidad, nerviosismo, taquicardia (aumento de la frecuencia cardiaca).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales, diuréticos, antianginosos, corticoides.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555

Consultas? Sugerencias? Llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 hs.

PRESENTACION

Envase con 100 comprimidos

Este medicamento como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico

Almacenar a temperatura ambiente inferior a 25°C.

☐ Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de Bayer AG, Alemania, en calle 8 entre 3 y 5, Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A., Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605EHD), Munro, Buenos Aires

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud, certificado N° 9.388

Fecha de última revisión: 21/12/2007

Disposición: 7659/07